

表3 1024名儿童不同身高血压值(毫米汞柱)

身高 (厘米)	人数	收缩压 (均值±标准差)	舒张压 (均值±标准差)
85~89.9	20	92.25±7.62	58.15± 9.63
90~94.9	126	94.02±11.25	58.94± 9.45
95~99.9	203	94.18±9.87	60.45± 8.09
100~104.9	209	96.02±8.03	61.12± 7.38
105~109.9	216	97.50±8.59	61.75± 7.77
110~114.9	146	98.04±8.62	61.95±10.03
115~119.9	84	101.21±8.62	66.45± 7.24
120~124.9	18	103 ±8.04	63.5 ± 7.7
125~129.9	2	105 ±7.07	75 ± 7.07

(占0.8%)。心尖区及腹主动脉区生理性收缩期杂音出现情况男女儿童相似,颈动脉区生理性收缩期杂音男比女高一倍。有两名血压在120/80毫米汞柱的男童分别于心尖区及右颈部听到一级收缩期杂音,其余有杂音的儿童血压均正常。

Wiliam等^[8]在7,119名6~11岁儿童中发现收缩期杂音占27%,舒张期杂音低于1%,3.5%杂音为重度或中度,其余为轻度(或无害

性杂音)收缩期杂音。认为重度杂音与基本疾病有关,收缩期杂音的存在和强度与收缩期血压的高度成正相关,而与舒张期血压无关。

我们在1,024名3~6岁儿童中发现276名儿童(占26.9%)有二级或二级以下收缩期杂音,与Wiliam报告相近

(张开华 整理)

参 考 文 献

1.广东番禺县心血管病防治区:中华心血管病杂志,9(2):88,1981。
2.杨思源:小儿心脏病学,第一版14页,人民卫生出版社,北京,1978。
3.北京儿童医院“实用儿科学”编辑组:实用儿科学,第一版569页,人民卫生出版社,北京,1977。
4.陶寿琪:中华心血管病杂志,6:239,1978。
5.陆义侠:国外医学参考资料,儿科分册,2:64,1977。
6.Voors AW et al: Pediat Clin North Am,25(1):15,1978。
7.Julius S et al: Pediat Clin North Am,25(1):35,1978。
8.Wiliam HR et al: Hypertension,1(6):559,1979。
9.Lopeo W et al: Philippine J Cardiology, VII (4):241,1979。

西藏墨脱县695例肠道寄生虫检出情况

湖南省第三批赴藏医疗队湘潭分队 龙国文

西藏墨脱县位于喜马拉雅山的东南侧,雅鲁藏布江下游,境内地广人稀,气候温和,海拔为800~2,500米。我们了解长期居住该地民族(门巴、珞巴、藏族)的肠道寄生虫感染情况,在1978年~1979年间,对当地695名群众进行了粪检工作。

一、检查对象:亚东公社、墨脱村,各区基建民工、集训和会议人员等当地群众,不分男女,年龄在

10个月以上者,均行粪检。

二、检查方法:盐水直接涂片法,少数标本用饱和盐水漂浮法找钩虫卵。

三、肠道寄生虫卵检出情况:见附表,表中钩蛔鞭蛲绦五虫混合感染者10人;钩蛔鞭蛲四虫混合感染者4人;钩蛔鞭三虫混合感染者600人;钩蛔二虫混合感染者694人;单有蛔虫者1人。

附 表

695例肠道寄生虫卵检出情况

	钩 虫			蛔 虫			鞭 虫			蛲 虫			绦 虫		
	男	女	计	男	女	计	男	女	计	男	女	计	男	女	计
阳性人数	379	315	694	380	315	695	314	286	600	2	2	4	6	4	10
感染率%	99.74	100	99.86	100	100	100	82.63	90.79	86.33	0.53	0.63	0.58	1.58	1.27	1.44

四、成人及儿童感染情况:在695例中,成人468人,10个月~15岁儿童227人。钩虫仅一例一岁三个

月的小儿未检出。蛲虫仅在儿童中发现。