

从银川郊区62份猪血清中查出波摩那群抗体阳性7份，豕群抗体阳性2份；从灵武县33份猪血清中查出豕群抗体阳性8份，两地猪血清总抗体阳性率为17.9%。文中还讨论了今后工作重点应放在发现钩体病人上。

ABSTRACT

Six strains of leptospira were isolated from kidneys of 476 slaughtered pigs and identified as *L.Pomona* by agglutination and absorption test with 13 serogroups 15 serotypes of leptospiral immune sera in Ningxia Autonomous Region in 1980-81. And 7 of 62 serum samples obtained from autochthonous pigs in the suburbs of Yinchuan City

were found positive for antibody against *L.pomona*, and 8 of 33 serum samples obtained from autochthonous pigs in Lingwu County positive for antibody against *L.tarassovi*.

参 考 文 献

- 耿贯一：流行病学，第一版（下册），317，人卫，1980。
- 李劫等：宁夏地区钩端螺旋体病存在的可能性，内部资料，1964。

（本实验承卫生部药品生物制品检定所钩体组指导工作，协助鉴定；银川市冷库肉检组同志、灵武县卫生防疫站吴素珍同志、宁夏回族自治区卫生防疫站冯志鹏、任宗喜、贾一平、芮建国等同志协助采样；张平镳、吴美云、王立伟、徐君福诸同志协助工作，特此一并致谢）

控制腹泻方案的计划与管理培训班简介

山西省太原儿童医院 张佩瑛

WHO和我国卫生部于1982年8月19~27日在山西太原联合举办了“控制腹泻方案的计划与管理培训班”。参加办班的主任（中外各1人）、辅导员（中外比例1:2,共15名）和学员（中国12名，外国23名）来自24个不同国家和地区。腹泻是一个全球性问题。每年约有500万名儿童可能死于腹泻（估计约占儿童死亡总数的30%）。为推动CDD方案的贯彻执行，WHO曾先后在泰国（曼谷）、孟加拉（达卡）、印度（加尔各答）、印度尼西亚、突尼斯等地多次举办CDD方案的计划与管理讲习班、讨论会和培训班。每次吸收20~40名学员，学员大多数来自发展中国家。培训的目的是使国家一级的CDD方案管理人员增长知识，改进技术，以期使学员回国以后能够合理安排、积极贯彻推行CDD方案。关于这种培训工作的方法学，有以下几个特点：

1.聘请世界各国对于腹泻的防治、教学、科研有丰富实践经验的专家来担任教学和辅导。

2.事前先编写印制出一套经过周密设计的教材（Modules），共12种：①导言（Introduction）；②国家重点项目（National Priority）；③任务与指标（Objective and Targets）；④近期指标（Subtargets）；⑤执行制度，实施系统（Delivery System）；⑥物资供应与后勤（Logistics）；⑦解决问题（Problem Solving）；⑧评审（Evaluation）；⑨假想国（Fictitia）；⑩疫苗的冷

链管理（Management of Cold Chain）；⑪控制腹泻国家方案的计划与评审手册（A Manual for Planning and Evaluation of Control of Diarrhoeal Disease Programme）；⑫治疗急性腹泻培训手册（A Manual for Training of Acute Diarrhoeal Disease Treatment）。其中“假想国”是一册精心构划的楷模，为制订国家级CDD方案示范。

3.配备数量较多的辅导员。本次辅导员与学员的比例是1:2。

4.以引导学员自学为主，有计划地按顺序依照时间进度各自阅读教材和做练习、演算，接着进行阶段性小组讨论。

5.最后阶段是深入基层到居民点进行抽样调查腹泻的患病率和病死率，作为小儿腹泻流行病学调查方法的示范。利用一天时间，组织全体辅导员和学员调查了太原近郊晋祠公社等三个居民点共5,789户，46,354人（5岁以下儿童2,527人），结果如下：

①近二周内患腹泻的5岁以下儿童114名，患病率为4.5%（114/2,527）；以此推算，1982年腹泻患病率为1.2次/人/年*（114/2,527×26）；

②一年内5岁以下儿童死亡数为2，都与腹泻无关，故腹泻病死率为0。

*根据WHO统计，每年每个5岁以下儿童腹泻发生次数为：亚洲2.6次；非洲1.6次；拉丁美洲1.8次。