

员要积极培养和大力支持,给予研究条件。同时倡议包虫流行的一些省区能有机会商讨研究协作的问题,力争在短期内作出一点成效,为争取参加下一次第十三届国际性包虫病学术会议做好准备。

参 考 文 献

- 1.张彦博等:包虫病的病原和诊断,26,30,32,44,青海人民出版社,西宁,1979。
- 2.耿贯一主编:流行病学中册,294,人卫,北京,1979。
- 3.钱中希等:新疆医学院学报,1(2):143,1978。
- 4.高文宽:包虫病72例临床分析,内部资料,1980。
- 5.杨立成等:包虫囊肿50例临床分析,内部资料,1981。
- 6.尹伯约:人体包虫病,23,24,32,39,49,63,甘肃人民出版社,兰州,1980。
- 7.胡家年:肝包囊虫病二十例X线分析,内部资料,1978。
- 8.西藏医学院等:西藏林芝地区常见寄生虫病感染情况的调查,内部资料,1979。
- 9.陈绍基等:肝泡球蚴病7例报告,内部资料,1977。
- 10.刘恒孝等:云南医药,(4):27,1978。
- 11.黄喻适等:湖南医学院学报,5(3):267,1980。
- 12.蒋次鹏:Chin Med J,94(11):771,1981。
- 13.薛弘燮等:新疆医学院学报,1(2):115,1978。
- 14.姚秉礼等:陕西新医药,10(6):17,1981。
- 15.陈绍基等:中华医学杂志,59(11):691,1979。
- 16.韩枋等:Chin Med J,94(6):391,1981。
- 17.蒋次鹏:多房型包虫病在我省的流行分布和防治研究,内部资料,1980。
- 18.徐明谦等:中华泌尿外科杂志,1(1):18,1980。
- 19.王天一等:小儿腹部包虫病73例分析,内部资料,1980。
- 20.马惠林:中级医刊,(9):35,1981。
- 21.刘瑾厚等:新疆医学院学报,3(4):233,1980。
- 22.王邦英等:青海医药,(5):36,1980。
- 23.洪礼祥:青海医药,(3):27,1980。
- 24.任震宇:中华外科杂志,19(12):760,1981。
- 25.陈文庆等:中华外科杂志,17(6):475,1979。
- 26.张玉香等:眼眶内泡状棘球蚴病一例报告,内部资料,1981。
- 27.杨三保:陕西新医药,(3):32,1975。
- 28.万恒麟:陕西新医药,10(7):30,1981。
- 29.中国人民解放军西藏军区后勤部卫生处:西藏地区流行病学与医学动物,43—47,1975。
- 30.黄建端等:肺包虫囊肿17例临床分析,内部资料,1981。
- 31.王正茂等:内蒙学报,(1):124,1981。
- 32.昌潍医学院附属医院:包虫病二例报告,内部资料,1978。
- 33.秦智、巴里坤县奎苏公社包虫病调查初步报告,内部资料,1979。
- 34.李优良:流行病学杂志,2(1):25,1981。
- 35.徐明谦等:中级医刊,(4):27,1979。

广西宾阳县脊髓灰质炎跛行调查

广西壮族自治区卫生防疫站

广西宾阳县卫生防疫站

广西第一期“冷链”管理学习班

为掌握脊髓灰质炎在我区的实际流行情况、病后致残率及其与服苗的关系等,进而为制订预防策略提供科学依据,我们于1982年9月间选择近年内发病率较高的宾阳县进行了本调查。

于武陵等7个公社(镇)中,共查出从1965年以来发生的跛行患者262例,其中确诊为本病后遗症者216例,现患率为66.92/10万。患者发病年龄,除1例为16岁外,其余均为7岁以下儿童,其中3岁以下占全部患者的95.32%。全部患者的现患年龄均在20周岁以下,其中1~4、10~14岁两个年龄组现患率最高。全部患者都有不同程度的肌萎缩或肢体畸形。全瘫或近于全瘫54例(25.11%),重度瘫痪19例(8.79%)、

中度瘫痪87例(40.46%)、轻度瘫痪56例(26.04%)。单侧下肢留有后遗症者185例,双侧者31例。肌张力检查则以3~4度者居多。患者中无服苗史者占67.59%。

该县从1973年起推行计划免疫,收到明显效果。但近年本病发病率大幅度回升,其主要原因,一是从1979年以来,基层卫生组织有所削弱,致使疫苗接种率不高,二是由于本区以往对疫苗低温冷藏贮存问题尚未解决,因而不得不采用冬天突击服苗办法,致使小年龄组婴幼儿服苗机会过少。为此,已拟在该县进行“冷链”工作试点,提高疫苗接种率和增加服苗机会,使易感者能尽快获得有效的免疫。

(曾冠帆 执笔)