

教育的基础上,对现症病人进行隔离治疗;对其密切接触者,用氯霉素预防服药。剂量:成人0.5g,2次/日,连服两天;小儿每天按每公斤体重25mg计算分两次服,连服两天;加强饮用水管理,作好饮水消毒(漂白粉精片);喝开水,不喝生水;厕所及病人排泄物用生石灰、来苏儿消毒;DDV灭蚊、蝇;教育群众不相互串门(在流行期)等措施后疫情平息。

A Report of Investigations on an Outbreak of Type B Paratyphoid Fever Yin Yun jian, et al., Hengyang suburb Hygiene and Epidemic prevention Station

A disease with main symptoms of fever, headache, malaise, profuse sweating and diarrhoea occurred as an outbreak in a few villages at suburb of Hengyang City from March to July 1987. It was diagnosed as Type B paratyphoid fever by

laboratory examinations. The number of cases occurred in this outbreak was 59 in total. All of them recovered after isolation and proper-treatment.

Key words Type B Paratyphoid fever
Outbreak

参 考 文 献

- 1.王季午主编.传染病学.北京:人民卫生出版社,1965, 5:22~24.
- 2.崔月犁主编.卫生防病人员岗位考核指南.北京:人民卫生出版社,1986,12:18.
- 3.王季午主编.传染病学.北京:人民卫生出版社,1965, 5:30.

(参加本次调查的有:睦金元 周从连 陈红莲 罗向东 肖启广 敖志强 陈运发 罗齐位 陈一民 徐正芳 邹顺来 王名福等同志)

(衡阳市第三医院、湖南省衡阳医学院第二附属医院提供了部分实验室资料,谨此致谢)

(1989年1月13日收稿,1989年9月4日修回)

广西桂林口岸艾滋病血清流行病学调查

桂林卫生检疫所 辛荣夫 黄化明 陈桂忠 苏琦 赵世藩 蒋宁园 彭传莉

我们对桂林口岸有关人群开展了艾滋病血清流行病学调查。现简报如下。

自1986年5月至1989年12月,我们采集了外籍港澳驻桂人员(含留学生)血清290份,援外回国人员106份,公安机关收容性乱者70份,注射进口丙种球蛋白者20份,白血病患者7份,外籍就诊人员58份,口岸涉外工作人员305份,宾馆服务人员809份,少数民族村民56份,健康体检437份,共2158份。其中男性1147份,女性1011份。年龄最大63岁,最小5岁。

检测HIV抗体方法:采用ELISA、IF、EIA、

GPAT法初检出HIV抗体阳性后,再用WB法复检,并经中国预防医学科学院病毒学研究所复查证实后确认。结果从2158份血清标本中检测出4例HIV抗体阳性,均为男性,其中一例是从上海入境来桂林旅游的美国公民,3例为驻桂的非洲留学生,均已离境。这表明HIV已侵入我市。也是广西首次发现HIV感染者。

(本次调查承蒙中国预防医学科学院病毒学研究所曾毅教授、桂林卫生检疫所所长、副主任医师白英指导,一并致谢)