鼠疫耶尔森菌和假结核耶尔森菌基因鉴别方法的建立及评价

石国祥 张政 梅玲玲 陈劲华 梅盛华 金大智 张志凯
王宇萌 张孝和 罗芸 孙继民 俞东征 夏连续

【摘要】 目的 建立鼠疫耶尔森菌和假结核耶尔森菌基因鉴别方法。方法 依据鼠疫菌、假结核菌特有的基因组序列[“疫岛(PeI)”和“假岛(PsI)”，与已公布的12株鼠疫菌和4株假结核菌全基因序列进行比对，设计特异性的引物，对鼠疫菌、假结核菌和其他肠道细菌进行鉴定。结果 用52株鼠疫菌、57株假结核菌和其他肠道菌株进行验证，结果显示，5对鼠疫菌的鉴定引物中，2对(PeI2和PeI11)仅在52株鼠疫菌中扩出目的条带，另3对引物(PeI1、PeI3和PeI12)除鼠疫菌外在部分假结核菌株中也扩出目的条带；5对假结核菌鉴定引物中，1对引物(PsI1)在52株鼠疫菌和57株假结核菌株中扩出目的条带，4对引物(PsI7、PsI16、PsI18和PsI19)仅在57株假结核菌株中均扩出目的条带，在鼠疫菌中未扩出目的条带。结论 用鼠疫菌和假结核菌共有的PsI1序列、鼠疫菌特有的PeI2和PeI11序列及假结核菌特有的PsI7、PsI16、PsI18和PsI19序列组成的基因鉴别方法，可以用于鼠疫菌和假结核菌的基因快速鉴别。

【关键词】 鼠疫耶尔森菌；假结核耶尔森菌；基因；鉴别

Establishment and evaluation of identification method for *Yersinia pestis* and *Yersinia pseudotuberculosis* Shi Guoxiang¹, Zhang Zheng¹, Mei Lingling¹, Chen Jinhua², Mei Shenghua³, Jin Dazhi¹, Zhang Zhikai⁴, Wang Yumeng⁴, Zhang Xiaohe⁵, Luo Yun¹, Sun Jimin¹, Yu Dongzheng⁴, Xia Lianxu⁴. 1 Zhejiang Provincial Center for Disease Control and Prevention, Hangzhou 310051, China; 2 Yiwu Prefecture Center for Disease Control and Prevention; 3 Longquan County Center for Disease Control and Prevention; 4 Institute for Communicable Disease Prevention and Control, Chinese Center for Disease Control and Prevention; 5 Wenzhou Prefecture Center for Disease Control and Prevention
Corresponding author: Xia Lianxu, Email: xialianxu@icdc.cn

This work was supported by a grant from the National Health Industry Research Projects of China (No. 201202021).

【Abstract】 Objective To establish a gene identification method of *Yersinia pestis* and *Yersinia pseudotuberculosis* for plague surveillance. **Methods** According to the specific genomic sequences of *Y. pestis* and *Y. pseudotuberculosis*, i.e. “pestitis Island (PeI)” and “pseudotuberculosis Island (PsI)” and the published genomic sequences of 12 strains of *Y. pestis* and 4 strains of *Y. pseudotuberculosis*, the specific identification primers of these sequences were designed. **Results** A total of 52 strains of *Y. pestis* and 57 strains of *Y. pseudotuberculosis* and other intestinal bacteria strains were tested with PCR. Of the 5 pairs of *Y. pestis* identification primers, PeI2 and PeI11 were specific for *Y. pestis*. Besides *Y. pestis*, the primers PeI1, PeI3 and PeI12 could detect part of 57 *Y. pseudotuberculosis* strains. Of the 5 pairs of *Y. pseudotuberculosis* identification primers, PsI1 could detect all the 52 strains of *Y. pestis* and 57 strains of *Y. pseudotuberculosis*. PsI7, PsI16, PsI18 and PsI19 were specific for *Y. pseudotuberculosis*. **Conclusion** The primers PsI1, PeI 2 and PeI11, PsI7, PsI16, PsI18 and PsI19 can be used in the rapid identification of *Y. pestis* and *Y. pseudotuberculosis*, which can be also used to explore the circulation of atypical *Y. pestis* in quiescent plague foci.

【Key words】 *Yersinia pestis*; *Yersinia pseudotuberculosis*; Gene; Identification

DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2015.05.018

基金项目: 国家卫生行业科研专项(201202021)

作者单位: 310051 杭州, 浙江省疾病预防控制中心(石国祥、张政、梅玲玲、金大智、罗芸、孙继民); 浙江省义乌市疾病预防控制中心(陈劲华); 浙江省龙泉市疾病预防控制中心(梅盛华); 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所(张志凯、王宇萌、俞东征、夏连续); 浙江省温州市疾病预防控制中心(张孝和)

通信作者: 夏连续, Email: xialianxu@icdc.cn

鼠疫耶尔森菌(*Yersinia pestis*, 鼠疫菌)和假结核耶尔森菌(*Yersinia pseudotuberculosis*, 假结核菌)为革兰阴性肠杆菌科耶尔森菌属细菌。耶尔森菌属有11个种,具有致病性的仅3个种,即鼠疫菌、假结核菌和小肠结肠炎耶尔森菌(*Yersinia enterocolitica*, 小肠结肠炎菌),3种菌在致病性方面存在着很大差异。历史上鼠疫曾出现多次世界性大流行^[1],导致至少1.6亿人死亡^[2]。研究表明,鼠疫菌由假结核菌的O:1b血清型菌株在1500~20000年前进化而来,两者DNA同源性很高,且在很短时间内转变成了具有极高致病力且高度保守的鼠疫菌^[3-4]。最近基于*adk*、*argA*、*aroA*、*glnA*、*thrA*、*tmk*、*trpE* 7个管家基因的MLST分析:在假结核菌O:1b血清型菌株中,有81.25%的菌株克隆群为ST43,而鼠疫菌的最主要克隆群ST90与ST43仅存在1个管家基因的差异,提示鼠疫菌与O:1b血清型假结核菌的遗传关系最近^[5]。微生物分类学上曾一度把鼠疫菌命名为假结核菌鼠疫变种,但是由于鼠疫菌在致病性和传播途径上与假结核菌感染差异很大,最后仍旧分为两个种。

鼠疫菌在自然界中可以以非典型形式长期保存,特别是在流行静息期^[6],用常规的细菌培养很难分离出鼠疫菌。因此本研究旨在建立针对鼠疫菌和假结核菌基因的鉴别方法,以便在遇到非典型菌株能够及时进行鉴别。

材料与方 法

1. 菌株来源:实验所用的鼠疫菌均由中国疾病预防控制中心传染病预防控制所鼠疫室保存,来自我国11类鼠疫自然疫源地的52株鼠疫菌,其中患者1株、媒介蚤4株、宿主动物47株。57株假结核菌和1株全基因组序列已在NCBI公布的LC20小肠结肠炎菌均分离自浙江省2005—2013年鼠粪便标本。

21株标准或参考菌株来自浙江省疾病预防控制中心的菌种保藏室,其他肠道菌株来自浙江省疾病预防控制中心微生物检验所肠道病原菌检测实验室。

2. 细菌分离和鉴定:鼠疫菌经鼠疫噬菌体裂解试验确认。假结核菌、小肠结肠炎菌分离:采集鼠的结肠部位粪便置于改良PBS中,置4℃冰箱中冷增菌15~21d,将增菌液接种到耶尔森菌选择性培养基上(CM0653, OXOID LTD, England),三段法划线、28℃培养,挑出24~36h培养才形成的肉眼可见、镜下菌落表面布满丛刺的可疑菌落,用API20E肠道菌试剂鉴定条(法国Biomerieux公司)进行系统生化鉴定。

3. PCR扩增:

(1)细菌DNA模板制备:分别将鼠疫菌和假结核菌接种到营养琼脂平板上,28℃培养48h后刮取菌苔,使用德国Qiagen公司的QIAamp DNA Mini Kit(51306)DNA提取试剂盒进行提取,-20℃保存备用。

(2)引物设计及片段测序:依据鼠疫菌“疫岛”及假结核菌“假岛”的基因片段^[7],在NCBI上重新对这些片段进行比对,选择“疫岛”和“假岛”上的特异性片段作为引物设计靶标,用Primer3在线引物设计工具设计引物,经鼠疫EV疫苗株及假结核菌进行初筛后再用于检测,引物名称、目标基因、引物序列及PCR扩增的退火温度等信息见表1。引物合成和片段的序列测定委托生工生物工程(上海)股份有限公司完成。

(3)扩增与产物检测:PCR反应体系采用宝生物工程(大连)有限公司的premix Taq PCR扩增混合体系(RR901A)。反应条件:94℃ 5 min;94℃ 30 s,退火30 s,72℃ 40 s,30个循环;72℃ 5 min。取扩增产物8 μl进行琼脂糖凝胶电泳,120 V电泳30 min后

表1 鼠疫菌和假结核菌引物名称、目标基因、引物序列及退火温度

引物	靶基因	引物序列(5'~3')		基因 ID	扩增位置	扩增长度 (bp)	退火温度 (℃)
		正向	反向				
pe1	YPO3436	CTTGCCATTAACACGCACCT	GAAAGGCTTACGGTCGCAAT	1176253	3 839 366 ~ 3 839 655	290	58
pe2	YPO0392	CAAGGTTCAAAAGGACTGGGT	TGATGCTGCTAATTCGCG	1173237	409 103 ~ 409 375	273	58
pe3	YPO2574	TCAATCCAATAGGCTGCGCTA	GGCAAATATGACGCAITGGC	1175405	2 894 592 ~ 2 894 788	197	58
pe11	YPO1668	CCCCTTCCAGAAAACCAAA	ATTTTGGGTGGAGGGACGAT	1174507	1 899 685 ~ 1 900 067	383	58
pe12	YPO2483 YPO2484	ACCAGCTAGTCTCTGTGCTC	TAAAGGTTGGCTCTGTGGA	1175317 1175318	2 785 544 ~ 2 786 004	461	58
ps11	YPTB0085	TACCGCATCACCTTGACCCG	GCTAACACCTTTGCGGCTTC	2955715	97 926 ~ 98 253	328	58
ps17	YPTB1059	ACGCACAGCCTTGACCAATGACA	AACGGCTATCGACCTCCACTTCC	2953440	1 266 230 ~ 1 266 472	243	58
ps116	YPTB2182	CCTCACACCGCGAATCACTA	CACAGGGGGCCGATATGTGTT	2954126	2 568 734 ~ 2 569 017	284	60
ps118	YPTB2200	CCATGTGCATTAAGCCGATT	AAACCCCGGTTATTACTGCT	2954137	2 593 178 ~ 2 593 494	317	57
ps119	YPTB2205	TTTTGACGAATTTAACCGGAACAC	ACATTGGGTCTGTCTGGCGTATT	2954142	2 597 583 ~ 2 598 048	466	58

在紫外检测仪上观测并记录结果。10 对引物扩增鼠疫菌和假结核菌的典型图谱见图 1。

结 果

1. 鼠疫菌检测:对来自我国 11 类鼠疫自然疫源地的 52 株鼠疫菌用 10 对引物进行 PCR 扩增,5 对鼠疫菌鉴定引物 (PeI1、PeI2、PeI3、PeI11、PeI12) 全部扩出目的条带;假结核菌 PsI1 引物在所有鼠疫菌中扩出目的条带,其他 4 对假结核菌鉴定引物 PsI7、PsI16、PsI18、PsI19 未扩出目的条带(图 1,表 2)。

2. 假结核菌检测:2005—2013 年浙江省分离的 57 株假结核菌经 10 对引物检测,5 对假结核菌鉴定引物全部扩出目的条带,2 对鼠疫菌鉴定引物 (PeI2 和 PeI11) 在 57 株假结核菌未扩出目的条带,另外 3 对鼠疫菌鉴定引物 (PeI1、PeI3 和 PeI12) 在部分菌株中扩出目的条带(图 1,表 3),条带经测序及比对,与鼠疫菌的序列基本相同。

3. 标准和参考菌株检测:17 株标准菌株和 5 株参考菌株(无标准号的 4 株及 1 株全基因组序列已公布的小肠结肠炎 LC20 菌株)经 10 对引物进行扩增,除 LC20 的小肠结肠炎菌 PsI7 扩出目的条带外,其他引物均未扩出条带。经序列比对,LC20 的片段序列与假结核菌的 PsI7 片段为同源性较低的非特异性片段。检测菌株的名称、标准号、数量见表 4。

4. 现场分离菌株和样品的检测:从浙江省鼠粪便样品中分离的 28 株小肠结肠

炎耶尔森菌、1 株弗氏或中间型耶尔森菌、1 株弗氏柠檬酸杆菌、1 株克吕沃尔菌、16 株从鼠粪便和鼠脏器中分离到的未定种菌株、从鼠洞泥土样品中分离的 3 株小肠结肠炎耶尔森菌、从人粪便中分离的 3 株小肠结肠炎耶尔森菌、1 株弗氏或中间型耶尔森菌、19 株沙门菌、1 株志贺菌、2 株气单胞菌、2 株布氏柠檬酸杆菌以及 5 份鼠洞泥土 DNA 样品经 10 对引物进行扩增,PsI1 在 4 株菌中扩出目的条带(3 株小肠结肠炎菌,1 株为福氏或中间型耶尔森菌);PsI7 在 1 株小肠结肠炎菌现场分离株中扩出目的条带外,其

表 2 52 株鼠疫菌来源及 PCR 扩增

疫源地序号	疫源地名称	菌株数	阳性菌株数			
			peI1、2、3、11、12	psI1	psI7、16、18、19	
I	松辽平原-察哈尔丘陵达乌尔黄鼠疫源地	4	4	4	0	
II	内蒙古高原长爪沙鼠疫源地	4	4	4	0	
III	青藏高原喜马拉雅旱獭疫源地	9	9	9	0	
IV	天山山地灰旱獭疫源地	4	4	4	0	
V	帕米尔高原长尾旱獭疫源地	4	4	4	0	
VI	甘宁黄土高原阿拉善黄鼠疫源地	4	4	4	0	
VII	锡林郭勒高原布氏田鼠疫源地	6	6	6	0	
IX	滇西山地齐氏姬鼠-大绒鼠疫源地	3	3	3	0	
X	滇西闽广沿海黄胸鼠疫源地	3	3	3	0	
XI	青藏高原青海田鼠疫源地	5	5	5	0	
XII	准噶尔盆地大沙鼠疫源地	6	6	6	0	
合 计		52	52	52	0	

注:10 对引物检测,每对引物 8 孔,1~4 孔为鼠疫菌 DNA,5~7 孔为假结核菌 DNA,N 为 ddH₂O 对照孔;M:Marker,从下到中间高亮度条带的分别为 100、200、300、400 和 500 bp

图 1 10 对引物检测鼠疫菌和假结核菌的电泳图谱

表 3 57 株假结核菌的 PCR 扩增

分离年份	检测菌株数	阳性菌株数				
		peI1	peI3	peI12	peI2、peI11	psI1、7、16、18、19
2005	1	1	0	0	0	1
2006	3	2	3	3	0	3
2007	13	10	10	11	0	13
2008	7	4	4	3	0	7
2009	15	5	5	6	0	15
2010	1	0	0	0	0	1
2011	6	2	1	1	0	6
2012	7	1	0	4	0	7
2013	4	0	2	2	0	4
合计	57	25	25	30	0	57

注:2012 年的 7 株菌株是从 6 份样品中分离而得,其中 1 份样品有 2 个不同的克隆

表 4 标准菌株和参考菌株

菌名	标准号	检测数量
<i>Escherichia (E.) coli</i>	ATCC25922	3
	ATCC11775、8089	
enteroinvasive <i>E. coli</i> (EIEC)	-	1
enterotoxigenic <i>E. coli</i> (ETEC)	-	1
enterohemorrhagic <i>E. coli</i> O157:H7	ATCC43888	1
<i>Enterobater cloacae</i>	CMCC45301	1
<i>Enterobater sakazakii</i>	ATCC51329	1
<i>Proteus vulgaris</i>	CMCC49027	1
<i>Citrobacter spp.</i>	-	1
<i>Salmonella typhi</i>	CMCC50097	1
<i>Salmonella enteritidis</i>	ATCC50041	1
<i>Salmonella paratyphi A</i>	ATCC50012	1
<i>Shigella dysenteriae</i>	CMCC51570	1
<i>Shigella sonnei</i>	CMCC51334	1
<i>Shigella flexneri</i> 2a	CMCC51573	1
<i>Klebsiella pneumoniae pneumoniae</i>	ATCC13883	1
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	ATCC17802	1
<i>Vibrio cholerae</i> O139	-	1
<i>Plesiomonas shigelloides</i>	ATCC14029	1
<i>Yersinia enterocolitica</i>	CMCC52202	1
<i>Yersinia enterocolitica</i> LC20	NCBI-CP007448.1	1
合计		22

他引物均未扩出目的条带。PsI7 检出阳性的 1 株菌经序列测定和片段比对,与假结核菌序列差异较大,与鼠疫菌不同源。PsI1 检出阳性的 3 株菌(另 1 株测序不成功)经序列测定,并在 NCBI 上进行 BLAST 比对显示,片段同源性较高。系统进化树分析显示,PsI1 片段可以将耶尔森菌属分成二个大的分支,一个大的分支为小肠结肠炎菌等,另一个大的分支为鼠疫菌和假结核菌,鼠疫菌除 CO92 株外,所有 12 株鼠疫菌与 6 株假结核菌序列完全相同并聚类在一起(图 2)。

讨论

鼠疫菌有 20 处特有的“疫岛”序列,假结核菌 39 处特有的“假岛”序列^[7],疫岛和假岛的确定,为鉴别鼠疫与假结核菌提供了较好的靶标。本研究通过对已公布全基因组序列的 12 株鼠疫菌和 4 株假结核菌进行比对,各选择 5 个片段设计引物,并对 22 株标准(或参考)菌株、全国 11 类鼠疫疫源地的 52 株鼠疫菌,浙江省现场分离的 57 株假结核菌、34 株小肠结肠炎耶尔森菌、2 株其他耶尔森菌、19 株沙门菌、7 株其他肠道菌株及样品等进行扩增,筛选出了 2 套鼠疫菌染色体上的特异性扩增引物 PeI2 和 PeI11(靶基因分别为 YPO0392、YPO1668)、4 套假结核菌染色体上的特异性扩增引物 PsI7、PsI16、PsI18 和 PsI19(靶基因分别为 YPTB1059、YPTB2182、YPTB2200 和 YPTB2205)。本文通过对 52 株鼠疫菌和 57 株假结核菌及其他一些肠道菌株进行 PCR 扩增,结果显示,假结核菌上的 PsI1 引物(靶基因 YPTB0085)可作为鼠疫菌和假结核菌的通用鉴定引物。这也从 PsI1 片段全序列 BLAST 比对

注:Y. pseudotuberculosis IP 32953 为参考菌株

图 2 用 PsI1 片段序列比对构建的耶尔森菌属系统进化树(邻-接法)

结果中获得理论依据(图2)。PsI1 片段全长 944 bp, 包括 2 个 CDS, glpX 基因(YPTB0085)编码果糖 1, 6-二磷酸酶 II; glpK 基因(YPTB0086)编码甘油激酶; 而鼠疫菌 CO92 株完全缺失了该片段。鼠疫菌 CO92 株是 1992 年从美国 1 例被猫感染的肺鼠疫患者中分离到, 2001 年由英国 Sanger 研究中心用鸟枪法完成全基因组的测序工作^[8], 是鼠疫菌中最早完成全基因组测序的菌株, 也是鼠疫菌基因组学分析的经典代表株。PsI1 被认为是“假岛”, 可能是在进行鼠疫菌和假结核菌基因组比较分析时, 选用了鼠疫菌 CO92 株与假结核菌的 IP32953 株进行分析得出的结果。当然这也从另外一个角度证实了鼠疫菌 CO92 株与其他在 NCBI 公布全基因组序列的 12 株鼠疫菌和本文完成检测的 52 株鼠疫菌之间的一个不同之处。虽然本文也发现在个别小肠结肠炎菌株中也能检测到 PsI1 的条带, 但从 PsI1 片段的系统发生树和序列测定结果来看, 小肠结肠炎菌株上片段的同源性与鼠疫菌和假结核菌相对较低, 而且也只在少数菌株中检出该片段, 完全可以通过本研究中的其他多对引物的检测加以排除。

鼠疫菌基因检测方法有环介导等温扩增检测^[9]和 TaqMan 探针实时荧光定量 PCR^[10]等, 上述方法选用的扩增靶目标均为鼠疫菌编码 F1 抗原的 *cafI* 基因。鼠疫菌 *cafI* 基因是在 65×10^6 的 pMT1 质粒上, 这对自然缺失 pMT1 质粒的鼠疫菌而言, 由于检测靶标的缺失造成错误的假阴性结果。环介导等温扩增技术虽不需要特殊仪器设备、在等温状态下扩增效率较高、较适用于基层或现场的检测, 但也存在环介导的稳定性不够、引物设计复杂、结果判定时个人主观因素影响较大等缺点。而荧光定量 PCR 虽然敏感、快速, 但因需要昂贵的特殊仪器, 不适合在基层和现场的推广和应用。而本文选用的检测靶标是在细菌的染色体上、稳定性高, 并经过了大量的鼠疫菌、假结核菌及小肠结肠炎等肠道菌株验证过的特异性靶标, 采用的又是经过较长时间发展的成熟的普通 PCR 扩增技术, 无论是在仪器设备还是在技术条件上, 非常适合在基层和现场的使用。

在我国目前的鼠疫监测中, 常会在野生动物大量死亡的情况下发现一些不明病原, 以往均作为“杂菌”处理掉, 而这些菌有可能是发生变异的鼠疫菌。前苏联也有过报道, 从鼠疫噬菌体作用过的无毒力鼠疫菌株中, 分离出 1 株抗鼠疫噬菌体菌株, 全部特性与假结核菌相似^[6]。何建等^[11]报道了 1 株具备鼠疫菌的典型形态特征、且能被鼠疫噬菌体裂解的菌株, 最

后经动物试验、鼠疫菌全基因芯片杂交、标识基因检测、DFR 分型和 MLST 分析等, 才确定是 1 株假结核耶尔森菌。而根据本文研究得出的一些特异性检测靶标, 就可以快速地鉴定这些细菌到底是鼠疫菌还是假结核菌, 从而达到快速鉴别和判定的目的。

在鼠疫流行静息期内或有微弱间断流行检出弱毒鼠疫菌和鼠疫血凝试验存在阳性的地区, 对于非典型菌的分离至关重要^[6]。在这样的地区, 仅靠细菌学分离的方法是无法完全解决问题的, 必须依靠分子生物学技术快速发展带来的极大便利, 应用简便、可靠的分子检测方法来提高检测的灵敏度, 同时也降低由于误判而带来的巨大社会风险, 本研究为应对这种可能性建立了一套检测方法。这将进一步丰富我国的鼠疫检测手段, 并对鼠疫静息疫源地的监测、非典型鼠疫菌的搜索等方面提供有益的帮助。

参 考 文 献

- [1] Morelli G, Song YJ, Mazzoni CJ, et al. Phylogenetic diversity and historical patterns of pandemic spread of *Yersinia pestis* [J]. *Nat Genet*, 2010, 42(12):1140-1143.
- [2] Perry RD, Fetherston JD. *Yersinia pestis*-etiologic agent of plague [J]. *Clin Microbiol Rev*, 1997, 10(1):35-66.
- [3] Achtman M, Zurth K, Morelli G, et al. *Yersinia pestis*, the cause of plague, is a recently emerged clone of *Yersinia pseudotuberculosis* [J]. *Proc Natl Acad Sci USA*, 1999, 96(24):14043-14048.
- [4] Skurnik M, Peippo A, Ervela E. Characterization of the O-antigen gene clusters of *Yersinia pseudotuberculosis* and the cryptic O-antigen gene cluster of *Yersinia pestis* shows that the plague bacillus is most closely related to and has evolved from *Y. pseudotuberculosis* serotype O:1b [J]. *Mol Microbiol*, 2000, 37(2):316-330.
- [5] Duan R, Liang JR, Shi GX, et al. Homology analysis of pathogenic *Yersinia* species *Yersinia enterocolitica*, *Yersinia pseudotuberculosis*, and *Yersinia pestis* based on multilocus sequence typing [J]. *J Clin Microbiol*, 2014, 52(1):20-29.
- [6] Song YF. The research progress of plague in atypical form in the long-term preservation of nature [J]. *Chin J Endemic Dis Prev Control*, 1995, 10(2):101-103. (in Chinese)
宋延富. 鼠疫以非典型形式在自然界长期保存的研究进展 [J]. *中国地方病防治杂志*, 1995, 10(2):101-103.
- [7] Yu DZ. Comparative analysis of *Yersinia pestis* and *Yersinia pseudotuberculosis* chromosomes [J]. *Dis Surveill*, 2011, 26(10):760-765. (in Chinese)
俞东征. 鼠疫与假结核耶尔森菌基因组比较分析 [J]. *疾病监测*, 2011, 26(10):760-765.
- [8] Parkhill J, Wren BW, Thomson NR, et al. Genome sequence of *Yersinia pestis*, the causative agent of plague [J]. *Nature*, 2001, 413(6855):523-527.
- [9] Wei D, Wang JY, Wang GZ. Development of loop-mediated isothermal amplification method for detection of *Yersinia pestis* [J]. *Chin J Health Laborat Technol*, 2012, 22(9):2074-2077. (in Chinese)
魏东, 汪洁英, 王国治. 鼠疫耶尔森氏菌环介导等温扩增检测方法的建立 [J]. *中国卫生检验杂志*, 2012, 22(9):2074-2077.
- [10] Wei Y, Zhou Y, Wang CH, et al. Rapid detection of *Yersinia pestis* with TaqMan probe by real time fluorescent quantitative PCR [J]. *Chin J Dis Contr Prev*, 2012, 16(11):954-957. (in Chinese)
韦耀, 周莹, 王春辉, 等. 鼠疫耶尔森菌 TaqMan 探针实时荧光定量 PCR 快速检测 [J]. *中华疾病控制杂志*, 2012, 16(11):954-957.
- [11] He J, Li YJ, Qi ZZ, et al. Systematic identification of a suspicious *Yersinia pestis* isolate [J]. *Chin J Zoon*, 2011, 27(4):355-358. (in Chinese)
何建, 李艳君, 祁芝珍, 等. 对 1 株疑似鼠疫耶尔森氏菌的系统鉴定 [J]. *中国人兽共患病学报*, 2011, 27(4):355-358.

(收稿日期:2014-10-30)

(本文编辑:万玉立)