

# 中国北方城市妇女妊娠前、妊娠期及产后家庭暴力的调查

郭素芳 吴久玲 渠川琰 严仁英

**【摘要】** 目的 探讨妊娠前、妊娠期及产后针对妇女的家庭暴力发生的现况以及相关的影响因素。方法 在天津市、河南省、辽宁省以及陕西省,采用分层整群抽样及面对面调查的方法,选择 32 个区,对有 6~18 月龄小儿的妇女进行调查,以了解她们妊娠前、妊娠期和产后家庭暴力的情况。采用 SPSS 软件进行分析。结果 中国北方部分地区妊娠前、妊娠期和产后家庭暴力总的发生率为 12.6%,其中性暴力的发生率最高(8.0%),心理暴力的发生率最低(3.5%),躯体暴力发生率居中(5.6%)。妊娠前、妊娠期和产后家庭暴力的发生率分别为 9.1%、4.3% 和 8.3%。进一步分析显示妊娠前发生家庭暴力则预示着妊娠期、产后很可能发生家庭暴力。单因素分析发现与家庭暴力相关的因素有:妇女和配偶的受教育程度低、结婚时间长、体力劳动者、个人月收入低、吸烟、饮酒。还发现妇女见到周围有人挨丈夫打的及夫妻关系不好者,发生家庭暴力的可能性大。结论 中国北方城市家庭暴力的发生率较高,应该引起足够的重视。对医务人员进行广泛深入的培训,以增强他们对家庭暴力的认识和反应,以及了解如何进行筛查和管理家庭暴力案例。

**【关键词】** 暴力;家庭;妊娠

**Domestic violence against women before, during and after pregnancy** GUO Su-fang\*, WU Jiu-ling, QU Chuan-yan, YAN Ren-ying. \*National Center for Women and Children's Health, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 100083, China

**【Abstract】 Objective** To examine patterns of abuse before, during, and after pregnancy and the possible factors related to abuse. **Methods** A community-based face-to-face survey of a representative group of women having a child aged 6 to 18 months in 32 communities of Tianjin, Liaoning, Henan and Shaanxi provinces was carried out between November 1, 2001 and February 28, 2002. **Results** The prevalence rate of domestic violence (emotional, sexual and physical) occurred in any period (before, during and after pregnancy) against women was 12.6%. The prevalence of domestic violence against women during the approximate 9 months of pregnancy (4.3%) was relatively lower than that during the 12 months before pregnancy (9.1%) and during the mean 11 months postpartum period (8.3%). Domestic violence against women before pregnancy was a strong risk factor for abuse during and post pregnancy. Abused women and perpetrators were more likely to be in lower social class were smoking cigarettes and drinking alcohol. Abused women were more likely to be witnessing violence in the past and having poor relationship with partner. **Conclusion** The prevalence of domestic violence against women was high which called for in-depth training and improving awareness for all health professionals.

**【Key words】** Violence domestic; Pregnancy

家庭暴力是产科一个特殊的问题。研究认为妊娠可能是家庭暴力的诱发因素或者使已经存在的问题更加严重。一些研究认为家庭暴力的发生比一些产科常见疾病高。本研究的目的是探讨妊娠前、妊娠期及产后丈夫针对妻子的家庭暴力发生情况以及

相关的影响因素。

## 对象与方法

1. 对象 采用分层整群抽样的方法,在天津市和辽宁、河南、陕西省的 6 个市 32 个区,对有 6~18 月龄小儿的妇女进行调查。调查时间为 2001 年 11 月至 2002 年 2 月。

2. 方法 在儿童计划免疫门诊或妇女的家中,采用面对面调查的方法进行调查。在调查前对所有的

基金项目:世界卫生组织资助项目(CHN/RPH/001)

作者单位:100083 北京 中国疾病预防控制中心妇幼保健中心(郭素芳、吴久玲、渠川琰)北京大学第一医院妇产科妇儿保健中心(严仁英)

调查员进行了培训,在调查过程中有专职的检查员对完成的每一份问卷进行检查,并且采用双录入的方式进行数据的录入。

3. 调查内容:调查对象及其配偶的社会人口学特征,家庭暴力的发生情况,生活经历以及与配偶的关系。

4. 相关的定义:家庭暴力是指丈夫对妻子的任何一种躯体上和/或性方面的和/或心理上的暴力和强迫行为。躯体暴力包括①打、推但无损伤或持续疼痛或无身体某部位活动受限;②拳打、脚踢、割伤并有持续疼痛或有身体某部位活动受限;③毒打、严重撞伤、烧伤、骨折;④头部损伤、脏器损伤、永久性损伤;⑤应用工具或武器并造成损伤。性暴力为(在你不愿意时)①不停地坚持一定要与您同房;②用各种方法威胁您与他同房;③用力迫使您,强行与您同房;④用绳子或其他东西捆住您,强行同房;⑤打您后,强行与您同房。心理暴力包括①经常用脏话骂您并使您感到很难受;②经常在其他人的面前羞辱您;③威胁要与您断绝关系;④威胁要打您或您所关心的人;⑤故意拿东西吓唬您要打您。妊娠前指婚后至妊娠开始这一段时间,如果这段时间超过 12 个月,则指妊娠开始前的 12 个月内。妊娠期指妊娠开始到分娩结束。产后指从分娩结束到接受调查这段时间。

5. 统计学分析:所有资料采取 Epi 6.0 软件两次录入,SPSS 10.0 软件进行单因素分析。

## 结 果

### 1. 家庭暴力发生的情况:

(1) 总暴力及妊娠前、妊娠期和产后家庭暴力的发生情况:共调查了 12 044 名产后妇女(平均为产后 11 个月)。调查结果显示我国北方部分地区家庭暴力的总发生率为 12.6%,其中性暴力的发生率最高(表 1)。

表1 总暴力及妊娠前、妊娠期、产后家庭暴力的发生率

发生时间	心理暴力		性暴力		躯体暴力		总暴力	
	发生例数	发生率 (%)	发生例数	发生率 (%)	发生例数	发生率 (%)	发生例数	发生率 (%)
妊娠前	232	1.9	704	5.8	473	3.9	1093	9.1
妊娠期	182	1.5	333	2.8	129	1.1	522	4.3
产后	305	2.5	593	4.9	387	3.2	998	8.3
合计	426	3.5	964	8.0	670	5.6	1518	12.6

(2) 妊娠前、妊娠期和产后家庭暴力的关系:调

查中发现妊娠前遭受家庭暴力的妇女比妊娠前未遭受家庭暴力的妇女,妊娠期更易遭受家庭暴力( $OR = 48.2, 95\% CI: 38.7 \sim 60.1$ );同时还发现,妊娠前遭受过家庭暴力,则产后也容易遭受家庭暴力( $OR = 42.6, 95\% CI: 36.2 \sim 50.2$ )。

### 2. 家庭暴力相关因素分析:

(1) 妇女及其配偶的社会人口学特征与家庭暴力的关系:分析显示受教育时间短、结婚时间长、从事体力劳动、月收入低、婚姻不稳定、生活在大家庭或独居、吸烟以及饮酒的妇女中家庭暴力的发生率高且有统计学意义。分析配偶的社会人口学特征与家庭暴力的关系显示年龄大、结婚时间长、受教育时间短,家庭暴力的发生率高,且有统计学意义。从事体力劳动、月收入低、吸烟、饮酒以及吸毒的配偶施暴的可能性大且有统计学意义(表 2)。

表2 妇女及其丈夫的社会人口学特征与家庭暴力的关系

人口学特征	妇 女		丈 夫	
	$\chi^2$ 值	P 值	$\chi^2$ 值	P 值
年龄	4.53	0.10	11.69	0.00
文化程度	22.84	0.00	21.21	0.00
结婚时间	9.54	0.01	13.56	0.00
职业			31.88	0.00
孕前	19.05	0.00	-	-
产后	29.91	0.00	-	-
收入			31.55	0.00
孕前	49.40	0.00	-	-
产后	39.31	0.00	-	-
吸烟	16.52	0.00	29.76	0.00
饮酒	59.15	0.00	27.40	0.00
吸毒	2.70	0.08	7.55	0.01
婚姻状况	17.64	0.00	-	-
家庭类型	16.37	0.00	-	-

(2) 生活经历与家庭暴力的关系:家庭暴力与是否曾经见到周围的人遭受家庭暴力( $\chi^2 = 283.94, P = 0.00$ ),见过父亲打母亲( $\chi^2 = 202.73, P = 0.00$ ),公公打婆婆( $\chi^2 = 248.22, P = 0.00$ )有关。

(3) 夫妻关系与家庭暴力的关系:结果显示夫妻关系紧张,害怕丈夫,经常与丈夫吵架,经常受到丈夫故意的冷落,丈夫经常故意损坏妻子心爱的东西,丈夫嫉妒心强,重男轻女,丈夫掌握家庭经济大权的家庭其妇女遭受家庭暴力的可能性高(表 3)。

## 讨 论

本次调查发现,我国北方部分地区妊娠前、妊娠期和产后这一时期家庭暴力的发生率为 12.6%,与国外的研究家庭暴力的发生率为 0.9%~22% 相

表3 夫妻关系与家庭暴力的关系

因素	$\chi^2$ 值	P 值
您害怕您的丈夫吗?	247.64	0.00
您会与您丈夫吵嘴吗?	227.19	0.00
您丈夫故意冷落您或疏远您吗?	485.61	0.00
您丈夫经常故意损害您心爱的东西或宠物吗?	360.66	0.00
如果您与别的男人说话,您丈夫会生气吗?	397.02	0.00
您丈夫总是给您施加压力要您生个男孩吗?	368.08	0.00
您丈夫希望您看病之前征求他的同意吗?	62.58	0.00
如果您需要用钱,您丈夫总是不乐意给您钱吗?	317.42	0.00

比<sup>[1]</sup>属于中等水平。但鉴于我国人口基数大,加之妇女普遍存在的“家丑不可外扬”的心态,以及对一些轻微的暴力如漫骂、推搡已习以为常,不把它们看作家庭暴力,故此发生率可能有所低估,因此我国家庭暴力的发生情况也很严重,要引起足够的重视。本次调查妊娠期家庭暴力的发生率为4.3%,低于妊娠前(9.1%)和产后(8.3%)家庭暴力的发生率。Leung 等<sup>[2]</sup>对美国一个华人社区 631 名怀孕妇女的调查显示,暴力发生率为17.9%,有4.3%发生在此次怀孕期间,与我们的结果相近。而且本次研究结果还显示妊娠期家庭暴力发生率比妊娠前、产后都低,这与国外的一些研究不同<sup>[3,4]</sup>,而与 Leung 等<sup>[2]</sup>研究一致。可能的解释是本次调查是在城市进行的,一个家庭只有一个孩子,使得孩子变得更加珍贵,所以妊娠期家庭暴力的发生率降低。

研究结果显示,妊娠前发生家庭暴力则预示着妊娠期、产后很可能发生家庭暴力。这与以往的研究结果相似<sup>[3]</sup>。因此提示,对在妊娠前遭受过家庭暴力的妇女,孕期产前检查时要特别注意是否有家庭暴力的发生,这有助于发现并制止妊娠期家庭暴力的发生,减少家庭暴力对母子的影响。

我们的调查发现,夫妻双方受教育时间短、从事体力劳动、月收入低与家庭暴力相关,这与以往的研究一致<sup>[5]</sup>。由此可见,我们的研究人群中家庭暴力主要发生在社会经济地位低的家庭中。因此认为预防家庭暴力的重点人群应是社会经济状况低下的人群。生活在大家庭或独居的女性遭受配偶虐待的可能性大,国外的研究也证实了这一点<sup>[4]</sup>。独居的女

性很可能是离异或分居的女性,而离异或分居很可能就是因为家庭暴力,因此独居和家庭暴力发生相关。而大家庭、婆媳关系不容易处理好,因而容易产生矛盾。妇女和配偶吸烟、饮酒的家庭发生暴力的可能性大。这与国外的研究一致<sup>[4]</sup>。暴力后借酒消愁,是暴力的结果而非原因。同时,药物滥用的男性易于施暴。预防和制止家庭暴力也应针对这些人群。我们的调查还显示夫妻关系与家庭暴力的关系很密切。夫妻关系紧张,发生家庭暴力的可能性大。Purwar 等<sup>[4]</sup>的研究也表明了这一点。提示夫妻关系不好可能是发生家庭暴力的一个危险因素,对这些人群应采取积极的干预措施,对夫妻双方进行调节,教他们如何处理好夫妻关系,这也是减少家庭暴力发生的一个措施。妇女的生活经历与家庭暴力关系密切,这与很多研究一致,证实了“暴力是一个社会习得行为”这一理论<sup>[6]</sup>:存在家庭暴力的家庭中的孩子,其长大后易成为施暴者或受虐者。因此很有必要对医务人员进行深入的培训,提高医务人员对家庭暴力的认识和反应,同时在产科门诊建立筛查家庭暴力的常规制度,以保证母子的身心健康。

## 参 考 文 献

- 1 Loraine B, Susan B, Gill M. Domestic violence in pregnancy. *Fetal and Maternal Medicine Review* 2001, 12:249-271.
- 2 Leung WC, Leung TW, Lam YY, et al. The prevalence of domestic violence against pregnant women in a Chinese community. *Int J Gynaecol Obstet* 1999, 66:23-30.
- 3 Sandra LM, Linda M, Lawrence LK, et al. Physical abuse of women before, during, and after pregnancy. *JAMA* 2001, 285:1581-1584.
- 4 Purwar MB, Jeyaseelan L, Varhadpande U, et al. Survey of physical abuse during pregnancy GMCH, Nagpur, India. *J Obstet Gynaecol Res* 1999, 25:165-171.
- 5 Ellsberg MC. Wife abuse among women of childbearing age in Nicaragua. *Am J Public Health* 1999, 89:241-244.
- 6 Ganley A. Understanding domestic violence. In: Warshaw G, Ganley A. eds. *Improving the health care response to violence: a resource manual for health care providers. Family violence prevention fund*, 1998. 24.

(收稿日期 2003-10-15)

(本文编辑:张林东)