

# 中国农村地区已婚妇女家庭暴力发生情况及其相关知识调查

赵凤敏 郭素芳 王临虹 吴久玲 王蕾

**【摘要】 目的** 了解中国农村地区已婚妇女家庭暴力发生情况及相关知识。**方法** 2004 年 11 月至 2005 年 1 月,在吉林、安徽省和重庆市的人口基金项目县,采用多阶段容量比例抽样方法随机抽取 25 个乡镇,对 3998 名 18 岁及以上的已婚妇女进行问卷调查。**结果** 调查地区家庭暴力发生非常普遍,一生中总暴力、心理暴力、躯体暴力和性暴力的发生比例分别为 64.8%、58.1%、29.7% 和 16.7%;调查前 12 个月中总暴力、心理暴力、躯体暴力和性暴力的发生比例分别为 42.6%、37.2%、14.0% 和 7.7%。不同种类家庭暴力常常同时存在,将近 1/3 的妇女同时遭受 2 种或 3 种家庭暴力的伤害。调查妇女对家庭暴力的认识较差,75.2% 的调查妇女对家庭暴力不了解,很多遭受过家庭暴力伤害的妇女对家庭暴力也一无所知,尤其是对心理暴力的知晓情况更差。**结论** 中国农村地区家庭暴力发生非常普遍,尤其是心理暴力,但已婚妇女对家庭暴力的了解还比较欠缺,需要引起有关部门的重视。

**【关键词】** 家庭暴力; 农村地区; 已婚妇女

**Investigation on the patterns and knowledge regarding domestic violence among married women in rural areas of China** ZHAO Feng-min, GUO Su-fang, WANG Lin-hong, WU Jiu-ling, WANG Lei. National Center for Women and Children Health, China Center for Disease Control and Prevention, Beijing 100013, China

**【Abstract】 Objective** To understand the knowledge and prevalence of domestic violence (DV) among married women in rural China. **Methods** Proportional to Population Size (PPS) sampling method was conducted to select 3998 women aged 18 years old and above from Jilin, Anhui and Chongqing. All the women were interviewed using a standardized questionnaire during Nov. 2004-Jan. 2005. **Results** The prevalence of spousal violence against women was 64.8% in a lifetime and 42.6% in the past 12 months before the survey. Psychological violence was the most common type, followed by physical violence and sexual abuse. The prevalence rates for psychological, physical and sexual violence in a life time were 58.1%, 29.7%, 16.7%, while 37.2%, 14.0%, 7.7% in the past 12 months before the survey. All the total DV, psychological violence and sexual violence were more commonly seen in Jilin province, while physical violence was more prevalent in Chongqing city. The prevalence rate of violence was different among people with different social-demographic characteristics. Sexual abuse became more common with the improvement of education. In total, about 1/3 women suffered two or three categories of violence at the same time. Most sexually abused women suffered one kind of violence, while half of the physically and psychologically abused women suffering two and more kinds of violent behaviors at the same time. Married women had relatively little knowledge on domestic violence and 75.2% of the women did not even know what domestic violence was referring to and some women suffered from DV themselves but knowing nothing about its implication. In general, physical violence was better understood among interviewed women while the knowledge about psychological violence was relatively poor. **Conclusion** Domestic violence, psychological violence in particular, was very common in rural China, while the knowledge of DV among married women was poor, effective actions should be taken to stop DV at no time.

**【Key words】** Domestic violence; Rural area; Married women

针对妇女的家庭暴力是一个全球普遍关注的重

要公共卫生问题和社会问题,对妇女及其子女的健康构成了极大威胁。针对妇女的家庭暴力包括躯体暴力、心理暴力、性暴力和经济控制四个方面。在我国有关家庭暴力的研究开展较晚,已有研究主要集

基金项目:联合国人口基金资助项目 (China/UNFPA RH/FP CPR/O3/P01)

作者单位:100013 北京,中国疾病预防控制中心妇幼保健中心国际合作项目部

中于特定人群或以机构为基础<sup>[1-4]</sup>,有关以人群为基础较大规模的家庭暴力的调查还较少,为了解我国农村地区普通人群中家庭暴力发生情况及相关知识了解状况,在联合国人口基金的资助下开展了本次调查。

## 对象与方法

1. 调查对象:中国/联合国人口基金生殖健康/计划生育第五周期项目 3 个项目县中 3998 名 18 岁及以上年龄的已婚妇女。3 个项目县分别是吉林省东辽县、安徽省居巢区和重庆市铜梁。现场调查时间为 2004 年 11 月至 2005 年 1 月。

2. 样本量及抽样方法:根据已有研究结果,家庭暴力发生率暂定为 10%,按照流行病学现场调查样本计算公式,需要调查对象人数为 3600 人,考虑到现场无法访问、拒访等因素,预期调查人数定为 4000 人。本次调查采用多阶段容量比例抽样方法获得调查对象。规定每个村调查 40 名已婚妇女,共需要 100 个村。根据各县的育龄妇女人数,确定吉林省东辽县共调查 5 个乡镇,800 名已婚妇女,安徽省和重庆市各调查 10 个乡镇各 1600 名已婚妇女。每个乡镇调查村数根据该乡镇育龄妇女人口数决定,乡镇和村的抽取考虑社会经济发展程度,即按照人均收入情况进行排序后随机抽取。样本人数用 SPSS 软件随机抽取。调查结束时,共回收了 4000 份问卷,其中 3998 份为有效问卷,问卷回收率为 100%,问卷有效率为 99.95%。

3. 调查方法和内容:本调查采用定量调查方法,以问卷形式由经过统一培训的调查员进行入户调查。本次调查通过了伦理委员会的审查,并在调查前向调查对象讲明为匿名调查,相关信息仅供研究分析使用,获得了调查对象的知情同意。为了保证被调查对象的安全和数据的真实性,调查过程中避免其他任何人在场,并告知被调查对象如果丈夫发现其接受了此调查时的处理对策。在调查家庭暴力部分时,由调查员参照另外一份空白问卷阅读出题和备选答案,然后让被调查对象自己在调查问卷中进行填写,调查员远离问卷。调查的内容主要有调查对象家庭暴力的发生情况及其对家庭暴力的了解状况。

4. 相关定义:本次调查中家庭暴力的定义采用 1993 年联合国《消除对妇女的暴力行为宣言》中对家庭暴力的定义:任何以性别为基础,对妇女造成或

可能造成身心和性行为伤害或痛苦的暴力行为,包括威胁要进行这类行为,强迫或任意剥夺自由等都属于家庭暴力范畴,不论其发生在公共场合还是私人领域内。本次家庭暴力调查的测量量表是以 CTS2(the revised conflict test scale)为基础开发成,该量表在国际社会上已经被广泛应用,具有较好的信度和效度。本次调查删除了其中有关“枪支”部分,并参考国内其他研究使用的量表进行修改,2 次预试验结果表明本次调查量表能较好的适用于我国,准确反映家庭暴力的发生情况。调查量表共包括 22 种暴力行为,规定只要有其中的一种行为发生即认为发生了家庭暴力。躯体暴力行为有 10 种,只要发生过其中任何一种行为即认为发生了躯体暴力:①动手打你的身体;②动手扇你耳光;③用手使劲拉扯你的头发;④用力推倒你;⑤用脚踢你;⑥用能造成伤害的东西砸你;⑦用火或开水烫你;⑧动用刀棍或其他武器打你;⑨掐脖子,让你无法呼吸;⑩将你的头往墙上撞。心理暴力行为有 8 种,只要发生过其中任何一种行为即认为发生了心理暴力:①用脏话辱骂;②使劲关门或摔东西;③故意弄坏属于你的东西;④长时间不理睬你;⑤故意在外人面前羞辱你,让你下不来台;⑥威胁要打你或你的亲人;⑦威胁要把你和你孩子分开;⑧限制你外出或与人交往。性暴力行为有 4 种,只要发生过其中任何一种行为即认为发生了性暴力:①在你不愿意时,不断的坚持与你同房(发生性行为),但没有用力迫使你;②在你不愿意时,通过暴力手段(打、捆绑等)强行与你同房(发生性行为);③在你不愿意时,强迫你与其进行口交或肛交;④将东西塞入阴道中或损害你的下身(生殖器)。

5. 统计学分析:资料录入使用 Epi Data 2.1 软件采用双录入法,用 SPSS 11.5 版软件进行数据分析。 $\chi^2$  检验以  $P < 0.05$  为差异有统计学意义。

## 结 果

1. 一般特征:共调查 3998 名年龄在 18 岁及以上的已婚妇女,其中安徽省 1598 名,吉林省 800 名,重庆市 1600 名。调查妇女平均年龄 35.4 岁,平均结婚时间为 12.9 年,95.4% 为初婚,汉族人群所占比例为 97.2%。大部分妇女是小学和初中文化水平,所占比例分别为 43.9% 和 30.8%,其次是文盲 (21.6%),高中及以上文化水平的比例较低,占 3.7%。绝大多数妇女从事务农或家务劳动,所占比

例分别为 58.7% 和 29.8%，其次是非农业体力劳动，占 7.0%。

2. 家庭暴力发生情况：到调查为止，3998 名妇女中，有 2589 名曾经在过去遭受过家庭暴力伤害，调查妇女家庭暴力总的发生比例为 64.8%，其中以心理暴力最为普遍，其次是躯体暴力，性暴力的发生比例相对较低。在调查前 12 个月中，1704 名妇女遭受过家庭暴力，调查前 12 个月中总暴力的发生比例为 42.6%，仍然是心理暴力最为常见。不同地区比较，无论是妇女一生中遭受的暴力还是在调查前 12 个月中发生的暴力，吉林省项目县调查点都高于安徽省和重庆市。经  $\chi^2$  检验， $P < 0.01$ ，差异有统计学意义(表 1)。

3. 不同种类家庭暴力的分布特点：比较不同人口学特征的妇女中各种家庭暴力的发生情况。结果显示，躯体暴力在不同年龄、不同结婚时间、不同文化程度的妇女中分布不同，30 岁及以上年龄的妇女躯体暴力发生比例为 31.2%，明显高于 29 岁及以下的妇女(23.8%)；结婚时间 3 年及以内和 4 年及以上的妇女躯体暴力发生比例分别为 13.9% 和 31.5%；文盲、小学、初中、高中及以上文化程度妇女中躯体暴力发生比例分别为 47.6%、47.1%、43.4%、40.4%，经  $\chi^2$  检验， $P < 0.01$ ，差异有统计学意义。心理暴力则主要在不同年龄和不同结婚时

间的妇女中存在差异，30 岁及以上年龄的妇女和 29 岁及以下年龄妇女中，心理暴力发生比例分别为 59.3% 和 53.2%；结婚时间 3 年及以内和 4 年及以上的妇女，心理暴力发生比例分别为 42.5% 和 59.9%，经  $\chi^2$  检验， $P < 0.01$ ，差异有统计学意义。性暴力则主要受到妇女的文化程度的影响，文盲、小学、初中、高中及以上文化程度妇女中，性暴力的发生比例分别为 22.0%、25.9%、27.2%、36.2%，经  $\chi^2$  检验， $P < 0.01$ ，差异有统计学意义。

4. 家庭暴力发生种类的构成：不同种类的家庭暴力常常同时发生，在发生过家庭暴力的 2589 名妇女中，50.5% 的受暴力妇女同时遭受 2 种及以上暴力形式的伤害，其中以心理暴力和躯体暴力同时存在最为常见，占全部受暴妇女的 29.9%。总的来讲，受暴妇女中只有心理暴力的比例最高，而只有躯体暴力的比例则非常低。在调查前 12 个月中发生过家庭暴力的妇女中，暴力种类的构成与一生中暴力发生种类的构成类似，但调查前 12 个月中发生的暴力中，只有 1 种暴力和只有心理暴力的比例都更高些，经  $\chi^2$  检验， $P < 0.01$ ，差异有统计学意义。不同地区比较，不管是一生中的暴力种类构成，还是调查前 12 个月内发生的暴力种类构成，吉林省调查点同时发生 3 种暴力和只有性暴力的比例都明显高于其他 2 个地区，经  $\chi^2$  检验， $P < 0.01$ ，差异有统计学意义(表 2)。

表1 不同调查地区妇女一生中家庭暴力和调查前 12 个月中家庭暴力的发生情况(%)

家庭暴力 种类	一生中家庭暴力发生情况				调查前 12 个月内家庭暴力发生情况			
	安徽省	吉林省	重庆市	合计	安徽省	吉林省	重庆市	合计
心理暴力	856(53.6)	517(64.6)	950(59.4)	2323(58.1)	595(37.3)	334(41.7)	557(34.8)	1487(37.2)
躯体暴力	366(22.9)	252(31.5)	569(35.6)	1187(29.7)	212(13.3)	142(17.7)	207(12.9)	560(14.0)
性暴力	221(13.8)	239(29.9)	209(13.1)	668(16.7)	107(6.7)	117(14.6)	83(5.2)	308(7.7)
总暴力	948(59.3)	588(73.5)	1053(65.8)	2589(64.8)	675(42.3)	419(52.3)	610(38.1)	1704(42.6)

注：括号外数据为人数，括号内数据为发生比例(%)

表2 不同调查地区发生过家庭暴力的妇女一生中发生的暴力和调查前 12 个月内发生暴力的种类构成(%)

暴力种类 构成	一生中家庭暴力发生情况				调查前 12 个月内家庭暴力发生情况			
	安徽省	吉林省	重庆市	合计	安徽省	吉林省	重庆市	合计
发生过 1 种	524(55.3)	265(45.1)	492(46.7)	1281(49.5)	461(68.3)	274(65.4)	407(66.7)	1142(67.0)
只有心理暴力	434(45.8)	195(33.2)	394(37.4)	1023(39.5)	381(56.4)	193(46.1)	354(58.0)	928(54.5)
只有躯体暴力	47(5.0)	6(1.0)	68(6.5)	121(4.7)	47(7.0)	33(7.9)	34(5.6)	114(6.7)
只有性暴力	43(4.5)	64(10.9)	30(2.8)	137(5.3)	33(4.9)	48(11.5)	19(3.1)	100(5.9)
发生过 2 种	353(37.2)	226(38.4)	447(42.5)	1027(39.6)	189(28.0)	116(27.7)	169(27.7)	474(27.8)
心理暴力 + 躯体暴力	246(25.9)	148(25.2)	382(36.3)	776(29.9)	140(20.7)	76(18.1)	139(22.8)	355(20.8)
心理暴力 + 性暴力	105(11.1)	77(13.1)	60(5.7)	242(9.3)	49(7.3)	36(8.6)	30(4.9)	115(6.8)
躯体暴力 + 性暴力	2(0.2)	1(0.2)	5(0.5)	8(0.3)	0(0.0)	4(1.0)	0(0.0)	4(0.2)
发生过全部 3 种	71(7.5)	97(16.5)	114(10.8)	282(10.9)	25(3.7)	29(6.9)	34(5.6)	88(5.2)
合 计	948(100.0)	588(100.0)	1053(100.0)	2591(100.0)	675(100.0)	419(100.0)	610(100.0)	1704(100.0)

注：同表 1

5. 家庭暴力行为:不管是妇女一生中遭受的暴力,还是在调查前 12 个月中遭受的暴力,“用脏话骂你”、“使劲关门或摔东西”和“常时间不理睬你”都是最常见的心理暴力行为,躯体暴力则以“动手打你的身体”和“用力推倒你”为主,性暴力中主要是“不断坚持同房”。不同地区,暴力行为的发生情况不同。心理暴力行为中,重庆地区以“用脏话辱骂”非常普遍,但“使劲摔门或摔东西”则相对较少;而安徽地区“长时间不理睬你”的比例则明显高于其他地区;躯体暴力行为中,“扇耳光”和“用脚踢”在吉林较其他地区更为普遍,经  $\chi^2$  检验,  $P < 0.01$ , 差异有统计学意义。从家庭暴力行为的种类来看,性暴力以 1 种暴力行为为主,占 97.0%,躯体暴力和心理暴力中则分别有 52.9% 和 48.8% 的妇女同时遭受 2 种及以上暴力行为的伤害(表 3)。

6. 对家庭暴力的了解情况:3998 名调查妇女中,70.5% (2818 名)的调查妇女听说过家庭暴力这个词。在没有发生过家庭暴力和发生过家庭暴力的妇女中,该比例分别为 64.9% 和 73.5%,经  $\chi^2$  检验,

$P < 0.01$ , 差异有统计学意义。但了解家庭暴力的妇女比例在暴力组和非暴力组间没有明显差别。可见,很多正在遭受家庭暴力伤害的妇女对家庭暴力仍然一无所知或缺乏足够的了解(表 4)。

7. 听说过家庭暴力的妇女对家庭暴力行为的了解情况:在听说过家庭暴力的 2818 名妇女中,3.1% 对常见的 17 种家庭暴力行为都不认识,11.7% 的妇女认识 1~5 种暴力行为,24.0% 认识 6~10 种暴力行为,40.1% 认识 11~16 种暴力行为,21.1% 对 17 种暴力行为全部认识。调查妇女对不同暴力行为的认识情况不同,86.8% 的调查妇女同意“迫使妻女卖淫”是一种家庭暴力行为,但对“长期拒绝与妻子过夫妻生活”的认同比例则不到 60%。同意“威胁要打对方或对方的家人”为家庭暴力的有 75.2%,但同意“长期不与妻子说话”是家庭暴力的只占 44.0%。总体来看,调查妇女对家庭暴力行为的认识比较欠缺,躯体暴力的知晓情况相对较好,心理暴力的认知情况较差,性暴力中对强迫妇女卖淫认识较好,而对剥夺妇女过正常性生活的权利认识较差(表 5)。

表 3 不同调查地区发生过家庭暴力的妇女一生中发生暴力和调查前 12 个月内发生暴力行为的发生比例(%)

家庭暴力行为	一生中家庭暴力发生情况				调查前 12 个月内家庭暴力发生情况			
	安徽省	吉林省	重庆市	合计	安徽省	吉林省	重庆市	合计
<b>心理暴力行为</b>								
用脏话辱骂你	530(61.9)	407(78.7)	839(88.3)	1776(76.5)	383(64.4)	245(73.4)	487(87.4)	1115(75.0)
使劲关门或摔东西	438(51.2)	273(52.8)	251(26.4)	962(41.4)	296(49.7)	151(45.2)	115(20.6)	562(37.8)
故意弄坏属于你的东西	92(10.7)	62(12.0)	79(8.3)	233(10.0)	38(6.4)	28(8.4)	27(4.8)	93(6.3)
长时间不理睬你	349(40.8)	138(26.7)	177(18.6)	664(28.6)	210(35.3)	55(16.5)	84(15.1)	349(23.5)
故意在外人面前羞辱让你下不来台	21(2.5)	95(18.4)	51(5.4)	167(7.2)	12(2.0)	39(11.7)	18(3.2)	69(4.6)
威胁要打你或你的亲人	18(2.1)	33(6.4)	52(5.5)	103(4.4)	10(1.7)	14(4.2)	26(4.7)	50(3.4)
威胁要把你和你的孩子分开	13(1.5)	19(3.7)	26(2.7)	58(2.5)	9(1.5)	10(3.0)	10(1.8)	29(2.0)
限制你外出或与人交往	29(3.4)	112(21.7)	39(4.1)	180(7.7)	11(1.8)	51(15.3)	14(2.5)	76(5.1)
<b>躯体暴力行为</b>								
动手打你的身体	210(57.4)	182(72.2)	420(73.8)	812(68.4)	126(59.4)	96(67.6)	140(67.6)	362(64.5)
动手扇你耳光	71(19.4)	111(44.0)	152(26.7)	334(28.1)	36(17.0)	53(37.3)	53(25.6)	142(25.3)
用手使劲拉扯你的头发	45(12.3)	46(18.3)	70(12.3)	161(13.6)	22(10.4)	23(16.2)	16(7.7)	61(10.9)
用力推倒你	227(62.0)	161(63.9)	272(47.8)	660(55.6)	124(58.5)	71(50.0)	78(37.7)	273(48.7)
用脚踢你	69(18.9)	140(55.6)	78(13.7)	287(24.2)	32(15.1)	54(38.0)	22(10.6)	108(19.3)
用能造成伤害的东西砸你	10(2.7)	18(7.1)	35(6.2)	63(5.3)	3(1.4)	9(6.3)	9(4.3)	21(3.7)
用火或开水烫你	0(0)	1(0.4)	3(0.5)	4(0.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)
动用刀棍或其他武器打你	3(0.8)	17(6.7)	20(3.5)	40(3.4)	1(0.5)	6(4.2)	7(3.4)	14(2.5)
掐脖子,让你无法呼吸	12(3.3)	12(4.8)	21(3.7)	45(3.8)	3(1.4)	3(2.1)	6(2.9)	12(2.1)
将你的头往墙上撞	5(1.4)	26(10.3)	29(5.1)	60(5.1)	1(0.5)	2(1.4)	9(4.3)	12(2.1)
<b>性暴力行为</b>								
不断的坚持与你同房	219(99.1)	233(97.5)	202(96.7)	654(97.9)	106(99.1)	116(99.1)	81(97.6)	303(98.7)
通过暴力手段强行与你同房	2(0.9)	7(2.9)	11(5.3)	20(3.0)	1(0.9)	1(0.9)	2(2.4)	4(1.3)
强迫你与其进行口交或肛交	2(0.9)	3(1.3)	5(2.4)	10(1.5)	1(0.9)	2(1.7)	3(3.6)	6(2.0)
将东西塞入阴道中或损害你下身	0(0.0)	3(1.3)	3(1.4)	6(0.9)	0(0.0)	0(0.0)	1(1.2)	1(0.3)

注:同表 1

表4 调查地区妇女对家庭暴力的了解情况

对家庭暴力的了解情况	未发生过家庭暴力		发生过家庭暴力		合计	
	人数	构成比 (%)	人数	构成比 (%)	人数	构成比 (%)
了解	205	14.5	387	14.9	592	14.8
了解一点	357	25.3	761	29.4	1118	28.0
听说,但不了解	353	25.1	755	29.2	1108	27.7
没有听说过	494	35.1	686	26.5	1180	29.5
合计	1409	100.0	2589	100.0	3998	100.0

表5 不同调查地区听说过家庭暴力的妇女对家庭暴力行为的认知(%)

家庭暴力行为	安徽省	吉林省	重庆市	合计
<b>躯体暴力</b>				
虐待不育或不育男婴的妻子	84.8	83.3	79.7	82.5
殴打女性家庭成员	87.4	88.5	84.2	86.4
<b>心理暴力</b>				
没有任何原因就训斥妻女	65.0	51.9	60.8	60.4
辱骂女性家庭成员	70.0	57.3	62.0	64.1
长期不与妻子说话	49.3	35.0	44.0	44.0
耻笑妻子的缺点弱点	55.0	37.7	47.6	48.3
威胁要打对方或对方的家人	75.5	73.6	75.8	75.2
威胁要把对方与孩子分开	69.7	63.2	63.5	65.8
限制妻子女儿与朋友同事交往	65.9	46.7	58.7	58.8
当对方生病时,不关心照顾	56.8	53.2	50.4	53.5
<b>性暴力</b>				
迫使妻女卖淫	87.8	88.9	84.5	86.8
长期拒绝与妻子过夫妻生活	63.1	49.0	60.7	59.0
强迫与女儿或姐妹发生性行为	85.0	80.9	81.2	82.6
强迫妻子过性生活	78.9	75.8	75.7	77.0
<b>经济控制</b>				
不让女儿上学	71.0	72.1	65.7	69.2
不给无生活来源的妻女生活费	70.0	64.5	58.6	64.3
不给无生活来源的父母生活费	70.6	63.5	58.4	64.2

讨 论

在我国,家庭暴力从 20 世纪 90 年代中期以后得到了越来越广泛的关注。本次人群调查结果显示我国农村地区家庭暴力发生非常普遍,一多半的妇女都遭受过家庭暴力伤害,其中约 2/5 的妇女在调查前的 12 个月中还受到过暴力伤害,这与其他研究结果类似<sup>[5,6]</sup>,但调查妇女对家庭暴力方面的知识了解情况却很不理想,即便是在遭受过家庭暴力伤害的妇女中,仍然有很多人不了解甚至没有听说过家庭暴力。可见,虽然最近几十年中我国妇女地位有了很大的提高,妇女已经积极参与到社会发展的各个领域,但是针对妇女的家庭暴力问题仍然非常严重,必须加大社会性别平等和反家庭暴力的宣传,让

人们了解家庭暴力并认识到家庭暴力存在的普遍性。吉林地区家庭暴力发生情况明显高于其他地区,且不同地区暴力发生的特点也存在很大差别,这可能与当地的传统和风俗习惯有关,家庭暴力干预时要注意地区特点和差异。

从暴力发生的特点来看,不同种类的家庭暴力在不同人口学特征的妇女中分布不同,文化程度越高的妇女遭受躯体暴力的可能性越小,但遭受性暴力的可能性则越大,而且随着时间的延续,躯体暴力在逐渐减少,而心理暴力的发生则有增加趋势。本次研究结果也表明,目前我国农村地区心理暴力已经成为最主要的暴力形式,单独的躯体暴力所占比例已经非常低。但调查妇女对有关心理暴力方面的知识了解却相对最差。由此可见,虽然很多妇女表示心理方面的虐待比躯体暴力还要让她们无法忍受,但并不认为这是一种暴力行为,很多人的观念中还将家庭暴力仅仅等同于躯体暴力。必须加强这方面的宣传,让人们认识到心理暴力行为的本质及其危害。

此外,不同家庭暴力形式之间有着非常高的关联性,很多家庭往往同时存在多种暴力形式,尤其是躯体暴力和心理暴力。对受暴妇女进行相关干预时要注意这个特点,特别是医务人员在面对受暴妇女时,要全面了解受暴妇女的受暴情况,而不只关注表面存在的暴力伤害,忽视隐性的暴力行为。

(在现场调查过程中得到调查地区相关人员的大力配合,一并感谢)

参 考 文 献

- 1 郭素芳,吴久玲,渠川琰,等. 中国北京城市妇女妊娠前、妊娠期及产后家庭暴力的调查. 中华流行病学杂志,2004,25:9-11.
- 2 吴久岭,郭素芳,熊玮仪,等. 人工流产妇女家庭暴力现状研究. 中国公共卫生,2003,19:1285-1287.
- 3 邹韶红,张亚林,黄国平. 抑郁症患者的家庭暴力及因素分析. 中国心理卫生杂志,2005,19:539-542.
- 4 蒋玉梅,甘美连,郑丽娟,等. 护士对外伤急诊病人家庭暴力的调查. 南方护理学报,2004,11:27-28.
- 5 张亚林,曹玉萍,杨世昌,等. 湖南省家庭暴力的流行病学调查. 中国心理卫生杂志,2004,18:326-328.
- 6 李兆辉,程怡民,王献蜜. 农村地区家庭暴力调查分析. 中国行为医学科学,2003,12:228-230.

(收稿日期:2005-12-22)

(本文编辑:张林东)