

我国大林姬鼠自然携带有肾综合征出血热病毒抗原检测

李泽林 等

正文见205页




图1 大林姬鼠肺泡上皮细胞质内
荧光颗粒为HFRS抗原 200×




图2 大林姬鼠肺泡上皮细胞质内无荧
光颗粒为正常血清对照 200×

短篇报道

口服小儿麻痹糖丸引起水痘样疱疹一例

广西柳州地区卫校 谈绍强

1981年2月我们在2个月至7岁儿童投放小儿麻痹糖丸活疫苗预防脊髓灰质炎的过程中，遇到一例服用糖丸后出现水痘样疱疹病例，这一现象值得进一步注意和研究。

患儿男，4岁，健康儿童。无接触传染病史。周围环境无麻疹、水痘等患儿。于1981年2月间首先服用小儿麻痹糖丸活疫苗I型(批号：11—21—19—38，中国医学科学院医学生物学研究所出品)，服后第三日右大腿内侧发现一花生米粒大小之疱疹。患儿无全身不适，正常进食与嬉戏。第四日，头面部、躯干等处散在发生黄豆至花生米粒大小不等的疱疹，呈圆形，

周围微红、疱疹液稍混浊，疱壁薄且易破。患儿精神、食欲尚好，大便正常。

查体：体温38.1°C，呼吸、脉搏正常。血象：白细胞11,000、中性粒细胞70%，淋巴细胞29%，嗜酸性粒细胞1%。心电图正常。X线胸透：心肺(一)。考虑为变态反应，即局部涂擦龙胆紫，口服红霉素，病毒灵及皮质激素治疗，第14日皮疹结痂、脱落、无疤痕。皮肤只遗留色素沉着。一月后，继续服用II+III型(同批号)，又相继出现上述皮肤表现。查体无阳性体征，即给予上述治疗，二周后痊愈，皮肤遗留色素沉着。