

Chinese Journal of Epidemiology

Volume 9

June 1988

Number 3

Isolation of human immunodeficiency virus from aids patient <i>Zeng Yi, et al</i>	(135)
Serological screening of HIV antibody in China <i>Zeng Yi, et al</i>	(138)
Study on the Surveillance of Domistic Rat Type Epidemic Haemorrhagic Fever <i>Su Tao, et al</i>	(141)
First report of an endemic area of EHF in Baoding prefecture <i>Liu Zhisen, et al</i>	(145)
An Application of Japanese B Encephalitis McAb For Reverse Passive Hemagglutination Test in the Sero-Diagnosis of JE <i>Zhao Guoguang, et al</i>	(148)
A Study on Arbovirus Antibodies of Birds in Niao-Diao-Mountain Area Eryan-County of Yunnan Province <i>Yang Qirao, et al</i>	(150)
A Multivariate Analysis of Risk Factors Affecting Infectivity of HBV Serological Marker Carriers in Family <i>Liu Tiepu, et al</i>	(154)

短篇报道

广东粤北地区流行性出血热首例报告

广东粤北第二医院 潘抗桓 何香兰

我院收治粤北地区首例流行性出血热患者，经广东省卫生防疫站测定恢复期血清免疫荧光抗体滴度为 $1:1280$ (+), 确立诊断。

患者陈××，男性，25岁，南雄县粮食局职工。于1986年3月初到各粮仓进行灭鼠工作。3月28日起发热、咽干、头痛、眼眶痛、咳嗽胸痛、腹泻水样便。双眼睑浮肿，脸发红。7天后出现尿少。到县医院就诊， $Bp90/60$ ，球结膜充血，面如醉酒状，胸前散在小出血点；腓肠肌压痛。以“钩端螺旋体病”收入院。入院后即咯血200ml，反复鼻衄，无尿。推注速尿200mg后方排尿。出现谵妄、摸空，大便柏油状。胸片双肺上、中、下肺野为点片状模糊阴影。尿蛋白++，管型4~6/HP，NPN 86mg\% ，因诊断不明病情

危重于4月9日转入本院。查 $Bp140/80$ ，嗜睡状，酒醉貌，双眼结膜高度充血、出血。肺底小泡音，腰肌、腓肠肌叩压痛明显。入院后顽固性呃逆、气促：反复咯新鲜血痰持续21天。入院后第2天尿量开始增加，多达 $3950\text{ml}/24\text{小时}$ ，但NPN继续升高至 150mg\% ，12天后才降至正常。血小板一度降至8万。胸片检查，35天后肺部阴影才完全吸收。经青霉素、氯霉素抗感染，止血及支持疗法等积极抢救，治愈出院。双份血清钩端螺旋体凝溶试验阴性，6月10日血清EHF免疫荧光抗体 $1:1280$ (+)。粤北地区与流行性出血热疫区的江西接壤，存在发生疫情危险，应予警惕。