

- cil. Stroke 1984; 15: 1105~1111.
9. Goldberg G, et al. Secondary prevention in stroke: a primary rehabilitation concern. Arch Phys Med Rehabil 1986; 69: 32~40.
10. Matsumoto N, et al. Natural history of

stroke in Rochester, Minnesota, 1955 through 1969: an extension of a previous study, 1945 through 1954. Stroke 1973; 4: 20~29.

(1989年12月27日收稿，1991年4月17日修回)

用聚合酶链反应鉴定立克次体

中国预防医学科学院流行病学微生物学研究所* 张远富 赵晶 匡平平 郝岩鹏 毕德增 范明远
军事医学科学院微生物流行病研究所 李银太 杨瑞馥 王津 林万明

病原性立克次体属分为三群：斑疹伤寒群、斑点热群、恙虫病群。对立克次体的鉴定一直采用血清学方法，近年来，用DNA聚合酶链反应（PCR）来检查、鉴定病原体是一种先进的方法。我们用DNA聚合酶链反应（PCR）对立克次体进行了检定。在检查中，使用了二对寡核苷酸（引物）。第一对引物（引物1、2）是根据编码立氏立克次体（落矶山斑点热病原体）17-KDa蛋白抗原基因的核苷酸序列合成的（引物1：GCTCTTGCACACTTCTATGTT；引物2：GCGGTGGACCTGCTTGTATC）。第二对引物是根据编码普

氏立克次体表面蛋白抗原基因核苷酸序列选择的（引物3：GGAAATTCAATGGGTTGCTGCTATG；引物4：TATTTGATCCTAGCCCCGCT）。第一对引物能使北亚蜱传斑点热及斑疹伤寒立克次体扩增出432碱基长度的片断；而不能扩增恙虫病及Q热立克次体。第二对引物只能使普氏立克次体扩增出长度为433碱基的片断，而不能扩增北亚蜱传斑点热恙虫病Q热和莫氏立克次体。

* 北京，邮政编码 102206

胃炎、胃溃疡幽门螺旋菌感染流行因素的主要成分分析

哲盟卫生防疫站* 韩淑英 王富昌 张丽娟 李建彩 佟伟军 白永山
内蒙古蒙医学院 赵宏林 张文全 王凤春

幽门螺旋菌（*Helicobacter Pylori*, HP）及其与胃炎、消化性溃疡等疾病的关系，已引起世界范围的重视。为探讨HP感染的流行因素，以便为今后开展HP感染的防治工作提供参考依据，我们对哲盟地区HP感染情况进行了流行病学调查，对其流行因素进行了多元统计分析。对象为1990年4月至1991年4月在内蒙古蒙医学院附属医院经胃镜诊断为胃炎、胃溃疡的患者。HP检查方法为涂片染色镜检和快速尿素酶试验。采用专门设计的调查表，调查内容有：一般情况、民族、吸烟、饮酒、经济收入、饮食习惯、饮水情况、接触牲畜史、家庭成员胃病史和病程年限等。采用单因素和多因素相结合的方法，结果在599例病人中，胃

炎481例，胃溃疡118例，HP阳性323例，阳性率53.92%。圆形分布法分析其季节分布，结果显示HP阳性率以7、8月份为最高（ $\alpha=204.5^\circ$, $S=88.87^\circ$, $P<0.01$ ）。用逐步回归分析法筛选出的重要因素为蒙古族、家庭成员有胃病史和接触牲畜。用主成分分析法对HP流行因素进行了分析。结果发现常饮生水、喜吃辣食、蒙古族、年龄、家庭成员有胃病史、吸烟、接触牲畜、性别及吃生菜9个因素可能是HP流行的重要因素。并对HP感染的可能传染源和传播途径进行了探讨。认为HP感染可能是人畜共患病之一。

* 邮政编码 028000